


**УТВЕРЖДЕНА**  
Приказом председателя  
Комитета Фармации  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан  
от « 14 » ~~ноября~~ 2017 г.  
~~№ N011844 / N011818 / N011821~~  
от « 15 » ~~ноября~~ 2017 г.  
~~№ N011850~~



**Инструкция по медицинскому применению  
лекарственного средства**

**Гексорал® Табс Классик**

**Торговое название**  
Гексорал® Табс Классик

**Международное непатентованное название**  
Нет

**Лекарственная форма**  
Таблетки для рассасывания апельсиновые, лимонные, медово-лимонные, черносмородиновые

**Состав**  
Одна таблетка содержит  
*активные вещества:* 2,4-дихлорбензиловый спирт 1.2 мг  
амилметакрезол 0.6 мг

*вспомогательные вещества:*

- сахара, глюкоза жидкая, кислоты лимонной моногидрат, краситель рибофлавина натрия фосфат, краситель пунцовый (Понсо 4 R), масло мяты, масло анисовое, масло сладкого апельсина (апельсиновые)
- сахара, глюкоза жидкая, кислоты лимонной моногидрат, краситель рибофлавина натрия фосфат, масло мяты, масло анисовое, масло лимона концентрированное (лимонные)
- сахара, глюкоза жидкая, краситель пунцовый (Понсо 4 R), краситель рибофлавина натрия фосфат, краситель карамель, масло мяты, масло лимона, медовое вкусовое вещество (медово-лимонные)

- сахароза, глюкоза жидкая, кислоты лимонной моногидрат, смесь красителей черного ПН и пунцового (Понсо 4R) (1.0 : 0.7), масло мяты, черносмородиновое вкусовое вещество (черносмородиновые).

#### **Описание**

Таблетки оранжевого цвета круглой формы с двояковыпуклой поверхностью (апельсиновые).

Таблетки желтого цвета круглой формы с двояковыпуклой поверхностью (лимонные).

Таблетки коричневатого-желтого цвета круглой формы с двояковыпуклой поверхностью (медово-лимонные).

Таблетки фиолетового цвета круглой формы с двояковыпуклой поверхностью (черносмородиновые).

Допускается наличие пузырьков воздуха и неровности краев.

#### **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты для лечения заболеваний респираторной системы. Препараты для лечения заболеваний горла. Антисептики. Прочие препараты.

Код АТХ R02AA20

#### **Фармакологические свойства**

##### ***Фармакокинетика***

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике Гексорал® Табс Классик отсутствуют.

##### ***Фармакодинамика***

Антисептический комбинированный препарат для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. 2,4-дихлорбензиловый спирт является производным бензола, амилметакрезол - производное фенола. Активные компоненты препарата вызывают местный антисептический и небольшой местноанестезирующий эффект; адгезия на слизистой способствует пролонгированию действия. Гексорал® Табс Классик устраняет симптомы раздражения слизистых оболочек верхних дыхательных путей, оказывает деконгестивное действие на слизистую оболочку, уменьшает заложенность носа, смягчает раздражение и боль в горле.

Механизм действия Гексорал® Табс Классик связан с коагуляцией белков микробных клеток, а также с взаимодействием с липидами клеточных мембран, что определяет эффективность против возбудителей. Активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а также обладает антимикотическим действием.

#### **Показания к применению**

- инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки.

#### **Способ применения и дозы**

Для взрослых и детей старше 12 лет рекомендуют рассасывать по 1 таблетке каждые 2-3 часа. Максимальная суточная доза - 8 таблеток. Таблетку следует медленно рассасывать до полного растворения. Курс лечения – 5-7 дней.

### **Побочные действия**

*Редко:*

- аллергические реакции

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- глюкозо-галактозная мальабсорбция
- детский возраст до 12 лет

### **Лекарственные взаимодействия**

Клинически значимого взаимодействия с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

### **Особые указания**

С осторожностью принимать препарат при эпилепсии, нарушении сердечной проводимости, шоке, нарушениях функции печени.

При продолжительности боли в горле более 2-х дней или при сопутствующей головной боли, тошноте, рвоте необходимо проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также при гипокалорийной диете. При длительном применении (в течение двух и более недель) оказывает повреждающее действие на зубы.

Если симптомы заболевания сохраняются, ухудшаются или появляются новые, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания препарата ребенком, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

### *Беременность и период лактации*

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только под контролем врача и только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и ребенка.

### *Особенности влияния на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами*

Не выявлено влияние препарата на способность управлять автомобилем и обслуживать движущееся механическое оборудование.

### **Передозировка**

Случаев передозировки препарата при применении в рекомендуемых дозах не выявлено.

### **Форма выпуска и упаковка**

По 4 таблетки помещают в контурную безъячейковую упаковку из фольги алюминиевой. По 2, 3 или 4 контурные упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную пачку.

По 8 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 2 или 3 контурные упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную пачку.

### **Условия хранения**

Хранить в сухом месте при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Срок хранения**

4 года

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

### **Производитель**

«Юник Фармасьютикал Лабораториз» (отделение фирмы «Дж.Б. Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.»), Индия

Нилам Сентер, крыло «Б», 4 этаж, Хинд Сайкл Роуд, Ворли, Мумбай – 400 030, Индия

### **Держатель регистрационного удостоверения**

ООО «Джонсон & Джонсон», Россия

121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корпус 2

*Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара) и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства.*

Филиал ООО «Джонсон & Джонсон» в Республике Казахстан

050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, павильон 23-А тел./факс: +7 (727) 356-88-11; +7 (727) 356-88-19

электронная почта: [safetyru@its.jnj.com](mailto:safetyru@its.jnj.com)