



УТВЕРЖДЕНА  
Приказом Председателя  
Комитета фармации  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан  
от «23» октября 2018 г.  
№ N017582, N017583, N017584,  
N017585

**Инструкция по медицинскому применению  
лекарственного средства**

**ГЕКСОРАЛ® ТАБС ЭКСТРА**

**Торговое название**

Гексорал® Табс Экстра

**Международное непатентованное название**

Нет

**Лекарственная форма**

Таблетки для рассасывания

(апельсиновые, лимонные, медово-лимонные, черносмородиновые)

**Состав**

Одна таблетка содержит

<i>активные вещества:</i> 2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	0.6 мг
лидокаина гидрохлорид	10.0 мг

*вспомогательные вещества:*

*апельсиновые*

- сахара, декстроза жидкая, лимонной кислоты моногидрат, ароматизатор мятный 9Т/10448, апельсина масло, аниса масло, краситель рибофлавин-5-фосфат натрия (E101), краситель Ponceau 4R (E124);

*лимонные*

- сахара, декстроза жидкая, лимонной кислоты моногидрат, мяты масло, лимона масла концентрат, аниса масло, краситель рибофлавин-5-фосфат натрия (E101);

*медово-лимонные*

- сахара, декстроза жидкая, мяты масло, ароматизатор медовый, эссенция лимонного масла, краситель карамель (E150a), краситель Ponceau 4R (E124), краситель рибофлавин-5-фосфат натрия (E101);

*Черносмородиновые*

- сахароза, декстроза жидкая, лимонной кислоты моногидрат, мяты масло, ароматизатор чёрносмородиновый, краситель Ponceau 4R (E124), краситель черный PN (E151).

### **Описание**

Таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью оранжевого цвета (апельсиновые).

Таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью желтого цвета (лимонные).

Таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью коричневатожелтого или коричневого цвета (медово-лимонные).

Таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью фиолетового цвета (черносмородиновые). Допускается наличие пузырьков воздуха в таблетках и неровности краев.

### **Фармакотерапевтическая группа**

Респираторная система. Препараты для лечения заболеваний горла. Антисептики. Прочие препараты.

Код АТХ R02AA20

### **Фармакологические свойства**

#### **Фармакокинетика**

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике Гексорал® Табс Экстра отсутствуют.

#### **Фармакодинамика**

Антисептический комбинированный препарат для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии.

2,4-дихлорбензиловый спирт является производным бензола, антисептик. Амилметакрезол – производное фенола, антисептик, обладает противомикробной активностью. Механизм действия 2,4-дихлорбензилового спирта и амилметакрезола связан с коагуляцией белков микробных и грибковых клеток, а также с взаимодействием с липидами клеточных мембран, что определяет эффективность против возбудителей.

Лидокаина гидрохлорид – производное ацетанилида, местный анестетик. Обладает мембраностабилизирующей активностью.

Активные компоненты препарата вызывают местный антисептический и местноанестезирующий эффект. Гексорал® Табс Экстра устраняет симптомы раздражения слизистых оболочек верхних дыхательных путей и полости рта, ощущение инородного тела, першения, саднения в глотке; оказывает противоотечное действие на слизистую оболочку, уменьшает заложенность носа, смягчает раздражение и боль в горле.

Гексорал® Табс Экстра - активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: большинства штаммов стафилококка (*S. epidermidis*, *S. pyogenes*, *S. aureus*, *S. salivarius*), стрептококков групп А, С и D, *Diplococcus pneumoniae*, *Pseudomonas*

*aerogenosa*, *Klebsiella aerogenes*, *Haemophilus influenzae*, *Proteus spp.*, *Aerobacter aerogenes*, *Aerobacter cloacae* и др., а также обладает антимикотическим действием в отношении дрожжеподобных грибов *Candida albicans*.

### **Показания к применению**

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

### **Способ применения и дозы**

Местно, для рассасывания в полости рта. Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется медленно рассасывать по 1 таблетке каждые 2-3 часа. Максимальная суточная доза - 8 таблеток. Курс лечения – 5-7 дней.

### **Побочные действия**

- нарушение глотания
- потеря чувствительности языка (соблюдать осторожность при приеме горячей пищи и воды)

*Редко:*

- аллергические реакции

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата, другим амидным местноанестезирующим средствам, наличие в анамнезе эпилептиформных судорог на лидокаин
- детский возраст до 12 лет

### **Лекарственные взаимодействия**

Клинически значимого взаимодействия с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

### **Особые указания**

*С осторожностью* принимать препарат при эпилепсии, нарушении сердечной проводимости, шоке, нарушениях функции печени.

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата.

Если симптомы заболевания ухудшаются, сохраняются или появляются новые, следует проконсультироваться с врачом.

Лидокаин снижает чувствительность слизистой оболочки, что может повышать риск аспирации.

При продолжительности боли в горле более 2-х дней или при сопутствующей головной боли, тошноте, рвоте необходимо проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит сахарозу, что необходимо учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В 1 таблетке для рассасывания содержится 1618,0 мг сахарозы, что соответствует 0,20 ХЕ.

Хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания препарата ребенком, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Не разгрызать и не проглатывать таблетку целиком.

Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности - не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду!

#### *Беременность и период лактации*

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только под контролем врача и только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и ребенка.

#### *Особенности влияния лекарственного препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами*

Не выявлено влияние препарата на способность управлять автомобилем и обслуживать движущееся механическое оборудование.

### **Передозировка**

Случаев передозировки препарата при применении в рекомендуемых дозах не отмечено.

Учитывая низкую системную абсорбцию активных веществ препарата передозировка маловероятна.

Возможная передозировка может привести к анестезии верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Лечение: симптоматическое.

### **Форма выпуска и упаковка**

Таблетки для рассасывания (апельсиновые, лимонные, медово-лимонные, черносмородиновые)

По 4 таблетки помещают в контурную безъячейковую упаковку из фольги алюминиевой. По 4 контурные упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную пачку.

### **Условия хранения**

Хранить в сухом месте при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Срок хранения**

4 года

Не применять после истечения срока годности.

### **Отпуск из аптек**

Без рецепта

### **Производитель**

«Юник Фармасьютикал Лабораториз» (отделение фирмы «Дж.Б. Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.»), Индия

Нилам Сентер, крыло «Б», 4 этаж, Хинд Сайкл Роуд, Ворли, Мумбай – 400 030, Индия

### **Владелец регистрационного удостоверения**

ООО «Джонсон & Джонсон», Россия

121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корпус 2

*Наименование, адрес и контактные (телефон, факс, электронная почта) данные организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства*

Филиал ООО «Джонсон & Джонсон» в Республике Казахстан

050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, павильон 23-А

тел./факс: +7 (727) 356-88 -11; +7 (727) 356-88-19

электронная почта: [safetyru@its.jnj.com](mailto:safetyru@its.jnj.com)